Notice : Information de l'utilisateur

STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation

olodatérol

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qu'il soit mentionné ou non dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. **Voir rubrique 4.**

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation ?

3. Comment utiliser STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

STRIVERDI RESPIMAT aide les personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) à respirer plus facilement. La BPCO est une maladie pulmonaire chronique qui provoque des difficultés respiratoires et une toux. Le terme BPCO est associé aux états de bronchite chronique et d'emphysème. La BPCO est une maladie chronique et vous devez donc utiliser STRIVERDI RESPIMAT tous les jours et non pas uniquement quand vous ressentez une gêne respiratoire ou d'autres symptômes de BPCO.

La substance active de STRIVERDI RESPIMAT est l'olodatérol, un bronchodilatateur bêta2 agoniste de longue durée d'action (également appelé agoniste bêta-2 adrénergique ou béta-2 mimétique) qui aide à ouvrir vos bronches pour ainsi faciliter la circulation de l'air dans les poumons. L'utilisation régulière de STRIVERDI RESPIMAT peut également vous aider si vous avez des difficultés respiratoires liées à votre maladie, et contribuera à diminuer les effets de la maladie sur votre vie de tous les jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation ?

N'utilisez jamais STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation dans les cas suivants:

- si vous êtes allergique à l'olodatérol ou à l'un des autres composants contenus dans le médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser STRIVERDI RESPIMAT

- si vous êtes asthmatique (vous ne devez pas utiliser STRIVERDI RESPIMAT pour le traitement de l'asthme).
- si vous avez une maladie du cœur.
- si vous avez une pression artérielle élevée.
- si vous êtes atteint d'épilepsie.
- si vous avez un problème spécifique de glande thyroïde, appelé thyrotoxicose.

- si vous avez un élargissement anormal d'une artère, appelé anévrisme.
- si vous êtes diabétique.
- si vous avez une insuffisance hépatique sévère, car STRIVERDI RESPIMAT n'a pas été étudié dans cette population de patients.
- si vous avez une insuffisance rénale sévère, car l'expérience est limitée avec STRIVERDI RESPIMAT dans cette population de patients.
- s'il est prévu de vous opérer.

Pendant le traitement avec STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation

- **Arrêtez d'utiliser le médicament et prévenez immédiatement votre médecin** si vous avez une sensation d'oppression dans la poitrine, une toux, une respiration sifflante ou un essoufflement immédiatement après avoir inhalé le médicament. Ces signes peuvent être ceux d'un bronchospasme (voir rubrique 4).
- Si votre respiration se détériore ou si vous présentez une éruption cutanée, un gonflement ou des démangeaisons immédiatement après avoir utilisé votre inhalateur, interrompez votre traitement et avertissez votre médecin immédiatement (voir rubrique 4).
- Si vous constatez des effets secondaires au niveau du coeur (augmentation de la fréquence des battements, augmentation de la pression artérielle et/ou augmentation de symptômes comme une douleur dans la poitrine), prévenez immédiatement votre médecin (voir rubrique 4).
- Si vous avez des spasmes musculaires, une faiblesse musculaire ou un rythme cardiaque anormal, consultez votre médecin car ces signes peuvent être dus à un taux de potassium faible dans le sang (voir rubrique 4).

STRIVERDI RESPIMAT est indiqué dans le traitement continu de la bronchopneumopathie chronique obstructive. **Il ne doit pas être utilisé comme traitement d'un épisode soudain d'essoufflement ou de sifflements respiratoires.**

N'utilisez pas STRIVERDI RESPIMAT avec certains médicaments contenant d'autres agonistes ß-adrénergiques de longue durée d'action tels que le salmétérol ou le formotérol.

Si vous prenez régulièrement certains médicaments appelés bêta-adrénergiques (ou béta2 mimétiques ou béta2 agonistes) de courte durée d'action, tels que le salbutamol, continuez à les utiliser uniquement pour soulager les symptômes qui surviennent de façon aiguë comme l'essoufflement.

Enfants et adolescents

STRIVERDI RESPIMAT **ne doit pas** être utilisé **chez les enfants ou les adolescents de moins de 18 ans.**

Autres médicaments et STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En particulier, prévenez votre médecin si vous prenez :

- certains médicaments pour des problèmes respiratoires du même type que STRIVERDI RESPIMAT (médicaments bêta-adrénergiques ou bêta-agoniste). Le risque d'effets indésirables pourrait être majoré.
- des médicaments appelés bêta-bloquants qui sont utilisés dans le traitement de l'hypertension ou d'autres problèmes cardiaques (tels que le propranolol) ou d'une affection oculaire appelée glaucome (par exemple timolol). Cela pourrait entraîner une diminution de l'effet de STRIVERDI RESPIMAT.
- des médicaments qui diminuent le taux de potassium dans le sang. Ils incluent :
  - o les corticoïdes (par exemple prednisolone),
  - o les diurétiques,
  - o des médicaments utilisés pour traiter les difficultés respiratoires tels que la théophylline.

  Si vous utilisez ces médicaments avec STRIVERDI RESPIMAT, vous pouvez ressentir des symptômes tels que des spasmes musculaires, une faiblesse dans les muscles ou un rythme anormal du cœur.
- des médicaments appelés antidépresseurs tricycliques ou inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) (tel que la sélégiline ou le moclobémide), qui sont utilisés pour traiter des troubles neurologiques ou psychiatriques comme la maladie de Parkinson ou la dépression; l'utilisation de ces médicaments augmente la probabilité d'effets indésirables touchant le cœur.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

Si vous ressentez des sensations de vertige lorsque vous prenez STRIVERDI RESPIMAT, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ni de machines.

3. COMMENT UTILISER STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

STRIVERDI RESPIMAT est destiné a être administré uniquement par inhalation.

Posologie

STRIVERDI RESPIMAT est efficace pendant 24 heures, aussi vous n'aurez besoin d'utiliser STRIVERDI RESPIMAT **qu'une seule fois par jour,** si possible à heure fixe dans la journée. À chaque fois, vous prendrez DEUX BOUFFÉES.

Dans la mesure où la BPCO est une maladie chronique, vous devez prendre STRIVERDI RESPIMAT tous les jours, et pas seulement lorsque vous ressentez des problèmes respiratoires.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

STRIVERDI RESPIMAT n'est pas destiné à être utilisé dans la population pédiatrique (moins de 18 ans).

Assurez-vous de bien connaître le mode d'utilisation de votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT. Les instructions d'utilisation de l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT sont fournies au verso de cette notice.

Si vous avez utilisé plus de STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation que vous n'auriez dû :

Vous pourriez être exposé(e) à un risque plus élevé d'effet indésirable comme une douleur thoracique, une pression artérielle élevée ou basse, des battements cardiaques plus rapides ou irréguliers ou des battements cardiaques perceptibles, des sensations de vertige, une nervosité, des difficultés à dormir, une anxiété, des maux de tête, des tremblements, une sécheresse buccale, des crampes musculaires, des nausées, de la fatigue, des malaises, des taux bas de potassium dans le sang (pouvant provoquer spasmes musculaires, faiblesse musculaire ou battements cardiaques anormaux), un taux de sucre dans le sang (glycémie) élevé ou trop d'acide dans le sang (pouvant provoquer nausées, vomissements, faiblesse, crampes musculaires et respiration plus rapide).

Si vous oubliez d'utiliser STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation :

Si vous avez oublié d'inhaler une dose, prenez simplement une dose à l'heure habituelle le lendemain. N'inhalez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation :

Vous devez consulter votre médecin ou votre pharmacien avant d'arrêter de prendre STRIVERDI RESPIMAT.

Si vous arrêtez de prendre STRIVERDI RESPIMAT, les signes et symptômes de la BPCO pourraient s'aggraver.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

La fréquence de survenue des effets indésirables est la suivante :

- Très fréquent : peut survenir chez plus de 1 personne sur 10
- Fréquent : peut survenir chez jusqu'à 1 personne sur 10
- Peu fréquent : peut survenir chez jusqu'à 1 personne sur 100
- Rare : peut survenir chez jusqu'à 1 personne sur 1000
- Très rare : peut survenir chez jusqu'à 1 personne sur 10 000
- Non déterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

Les effets indésirables décrits ci-dessous ont été observés chez des patients prenant ce médicament et sont listés selon leur fréquence de survenue rapportée : peu fréquent ou rare.

Peu fréquent :

- Rhinopharyngite (nez qui coule)
- Sensations de vertiges
- Éruption cutanée

Rare :

- Arthralgie (douleur articulaire)
- Hypertension

Vous pourriez aussi avoir des effets indésirables connus pour se produire avec certains médicaments similaires à STRIVERDI RESPIMAT utilisés pour les problèmes respiratoires (médicaments bêta-adrénergiques). Ces effets peuvent être des battements cardiaques plus rapides ou irréguliers ou des battements cardiaques perceptibles, une douleur dans la poitrine, une pression artérielle élevée ou basse, des tremblements, des maux de tête, de la nervosité, des difficultés à dormir, des sensations de vertiges, une sécheresse buccale, des nausées, des crampes musculaires, de la fatigue, des malaises, des taux bas de potassium dans le sang (pouvant provoquer spasmes musculaires, faiblesse musculaire ou rythme cardiaque anormal), un taux de sucre dans le sang élevé ou trop d'acide dans le sang (pouvant provoquer nausées, vomissements, faiblesse, crampes musculaires et respiration plus rapide).

Des réactions allergiques immédiates peuvent également survenir après la prise de STRIVERDI RESPIMAT, comme une éruption cutanée, une urticaire, un gonflement de la bouche, du visage ou des difficultés respiratoires soudaines (oedème de Quincke), ou d'autres réactions d'hypersensibilité. Dans ce cas, arrêtez d'utiliser STRIVERDI RESPIMAT et consultez immédiatement un médecin.

En outre, comme pour tous les médicaments inhalés, certains patients peuvent présenter une oppression atypique dans la poitrine, une toux, des sifflements respiratoires ou un essoufflement immédiatement après l'inhalation (bronchospasme).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur l'étiquette de l'inhalateur après {EXP}. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. L'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT doit être jeté après insertion de la cartouche au plus tard au bout de trois mois d'utilisation.

Ne pas congeler.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation ?

La substance active est :

Olodatérol ..... 2,5 microgrammes

(sous forme de chlorhydrate d'olodatérol)

Pour une dose délivrée

La dose délivrée correspond à la quantité d'olodatérol délivrée à la sortie de l'embout buccal.

Les autres composants sont :

Chlorure de benzalkonium, édétate disodique, eau purifiée, et acide citrique (anhydre).

Qu'est ce que STRIVERDI RESPIMAT 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'une solution pour inhalation en cartouche et d'un inhalateur RESPIMAT. La cartouche doit être insérée dans l'inhalateur avant la première utilisation.

Boîte unique: un inhalateur RESPIMAT et une cartouche de 60 bouffées (30 jours de traitement).

Boîte double: 2 boîtes uniques, contenant chacune un inhalateur RESPIMAT et une cartouche de 60 bouffées (30 jours de traitement).

Boîte triple: 3 boîtes uniques, contenant chacune un inhalateur RESPIMAT et une cartouche de 60 bouffées (30 jours de traitement).

Boîte octuple: 8 boîtes uniques, contenant chacune un inhalateur RESPIMAT et une cartouche de 60 bouffées (30 jours de traitement).

Toutes les présentations ne sont pas nécessairement commercialisées.

Titulaire

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173
D-55216 INGELHEIM AM RHEIN
ALLEMAGNE

Exploitant

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
14, RUE JEAN ANTOINE DE BAÏF
75013 PARIS
FRANCE

Information médicale : 03 26 50 45 33

Fabricant

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
BINGER STRASSE 173
D-55216 INGELHEIM AM RHEIN
ALLEMAGNE

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

Norvège : Striverdi

Dans les autres pays d'Europe : Striverdi Respimat

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mai 2014.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

Mode d'emploi

Inhalateur STRIVERDI RESPIMAT

Comment utiliser votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT ?

Cette notice explique comment utiliser et entretenir votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT. **Veuillez lire et respecter attentivement ces instructions**. Veuillez également vous reporter à la rubrique 3. « Comment utiliser STRIVERDI RESPIMAT » au recto de cette notice.

L'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT libère le médicament lentement et doucement, ce qui le rend plus facile à inhaler.

L'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT vous permet d'inhaler le médicament contenu dans une cartouche. Une cartouche pleine permet de délivrer 60 bouffées (30 jours de traitement). **Vous n'aurez besoin d'utiliser cet inhalateur qu'UNE SEULE FOIS PAR JOUR**, si possible à la même heure de la journée. **À chaque fois, que vous l'utilisez, vous prendrez DEUX BOUFFÉES**. La cartouche contient suffisamment de médicament

pour un traitement de 30 jours si l'inhalateur est utilisé conformément aux instructions d'utilisation. Dans la boîte, vous trouverez l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT et la cartouche STRIVERDI RESPIMAT. Insérer la cartouche fournie avant d'utiliser l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT pour la première fois.

Inhalateur STRIVERDI RESPIMAT et cartouche STRIVERDI RESPIMAT

<u>1) Insertion de la cartouche</u>

Les étapes suivantes 1 à 6 sont nécessaires avant la première utilisation :

1

1. En maintenant le capuchon jaune (A) fermé, appuyez sur le cliquet de sécurité (E) tout en retirant la base transparente (G).

2a

2. Sortez la cartouche (H) de la boîte. Poussez l'extrémité **la plus étroite** de la cartouche dans l'inhalateur jusqu'à ce qu'elle **s'enclenche**.

2b

Poussez **fermement** le fond de la cartouche contre une surface solide afin qu'elle pénètre au maximum dans l'inhalateur (2b).

La cartouche dépassera de l'inhalateur, la bande argentée du bas de la cartouche étant toujours visible.

Ne retirez pas la cartouche lorsqu'elle a été insérée dans l'inhalateur.

3

3. Remettez en place la base transparente (G).

Ne retirez plus la base transparente.

2) Préparation de l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT pour la première utilisation

4

4. Maintenez l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT verticalement, avec le capuchon jaune (A) fermé. Tournez la base (G) dans la direction des flèches noires imprimées sur l'étiquette jusqu'à entendre **un déclic** (un demi-tour).

5

5. Ouvrez le capuchon jaune (A) jusqu'à ce qu'il s'ouvre complètement avec un claquement.

6

6. Dirigez l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT en direction du sol.

Puis appuyez sur le bouton de libération de la dose (D). Fermez le capuchon jaune (A).

Répétez les étapes 4, 5 et 6 jusqu'à ce qu'un nuage soit visible.

Puis répétez les étapes 4, 5 et 6 trois autres fois pour que l'inhalateur soit prêt à être utilisé.

Votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT est maintenant prêt à l'emploi.

Ces étapes n'affecteront pas le nombre de doses disponibles. Après cette préparation, votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT pourra délivrer 60 bouffées (30 jours de traitement).

Utilisation quotidienne de votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT

Vous n'aurez besoin d'utiliser cet inhalateur qu'UNE SEULE FOIS PAR JOUR.

Chaque fois que vous l'utiliserez, prenez DEUX BOUFFÉES.

I

I. Maintenez l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT en position verticale, avec le capuchon jaune (A) fermé, afin d'éviter la libération accidentelle d'une dose. Tournez la base (G) dans la direction des flèches noires imprimées sur l'étiquette jusqu'à entendre un déclic (un demi-tour).

II

II. Ouvrez le capuchon jaune (A) jusqu'à ce qu'il s'ouvre complètement (avec un claquement). Expirez lentement et complètement, puis fermez vos lèvres autour de l'extrémité de l'embout buccal sans recouvrir les prises d'air (C). Dirigez votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT vers le fond de la gorge.

Tout en inspirant lentement et profondément par la bouche, appuyez sur le bouton de libération de la dose (D), et continuez d'inspirer lentement aussi longtemps que vous le pouvez. Maintenez votre respiration pendant 10 secondes ou aussi longtemps que vous le pouvez sans être gêné.

III. Répétez les étapes I **et** II **afin de recevoir la dose complète.**

Vous n'utiliserez cet inhalateur qu'UNE SEULE FOIS PAR JOUR.

Fermez le capuchon jaune jusqu'à l' utilisation de l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT le jour suivant.

Si l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT n'a pas été utilisé pendant plus de sept jours, libérez une bouffée vers le sol.

Si l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT n'a pas été utilisé pendant plus de 21 jours, répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce qu'un nuage soit visible. Puis, répétez les étapes 4 à 6 trois autres fois.

Quand se procurer un nouvel inhalateur STRIVERDI RESPIMAT ?

L'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT contient 60 bouffées (30 jours de traitement). L'indicateur de doses montre approximativement quelle est la quantité de médicament restant dans l'inhalateur. Lorsque l'indicateur entre dans la zone rouge de l'échelle, il reste suffisamment de médicament pour environ sept jours de traitement (14 bouffées). C'est le moment où vous devrez renouveler votre prescription pour un nouvel inhalateur STRIVERDI RESPIMAT.

Lorsque l'indicateur de dose aura atteint la fin de l'échelle rouge (c'est-à-dire que l'ensemble des 60 bouffées auront été administrées), l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT sera vide et se bloquera automatiquement. A ce stade, la base ne peut plus être tournée.

Au plus tard après trois mois d'utilisation, l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT doit être jeté même si la totalité du médicament n'a pas été utilisée.

Que faire, si... ?

Que faire, si...	**Raison**	**Que faire**
Je ne peux pas tourner la base facilement.	a) l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT est déjà préparé et prêt à être utilisé.	a) l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT peut être utilisé immédiatement.
	b) l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT est bloqué après 60 bouffées.	b) préparez et utilisez un nouvel inhalateur STRIVERDI RESPIMAT.
Le capuchon est entièrement détaché de l'inhalateur.	En ouvrant le capuchon, celui-ci a été tiré trop fort.	Le capuchon peut être facilement remis en place.
Je ne peux pas appuyer sur le bouton de libération de la dose.	La base transparente n'a pas été tournée.	Tournez la base transparente jusqu'à entendre un **déclic** (un demi-tour).
La base transparente revient dans sa position initiale après que je l'ai tournée.	La base transparente n'a pas été tournée suffisamment loin.	Préparez l'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT en tournant la base transparente jusqu'à entendre un **déclic** (un demi-tour).
Je peux tourner la base transparente au-delà du point où j'entends un déclic.	Soit le bouton de libération de la dose a été pressé, soit la base	En maintenant le capuchon jaune **fermé**, tournez la base jusqu'à entendre un **déclic** (un demi-tour).

translucide a été tournée trop loin.

Comment entretenir votre inhalateur ?

Nettoyer l'embout buccal, y compris la partie métallique à l'intérieur, uniquement avec un linge ou un tissu humide, au moins une fois par semaine.

Une décoloration mineure de l'embout buccal n'affecte pas les performances de votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT.

Le cas échéant, essuyez l'extérieur de votre inhalateur STRIVERDI RESPIMAT avec un linge humide.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L'inhalateur STRIVERDI RESPIMAT ne doit pas être démonté après l'insertion de la cartouche et la remise en place de la base transparente.

Ne pas toucher l'élément de perçage à l'intérieur de la base.

CE 0123

BOEHRINGER INGELHEIM France cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. BOEHRINGER INGELHEIM France participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. BOEHRINGER INGELHEIM France vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.